

全國潔牙比賽 考試題目

是非題

- 1.(X)一般乳牙受撞擊脫落，如果處理得當，30 分鐘內再種回去，成功機率很高 P.29
- 2.(X)目前台灣有飲水加氟的區域為南投的中興新村 含氟漱口水單張
- 3.(O)因蛀牙而需根管治療的乳牙，以不銹鋼乳牙冠(或全瓷乳牙冠)恢復乳牙正常形狀及咀嚼功能，若將來換牙，不銹鋼乳牙冠(或全瓷乳牙冠)與乳牙一起脫落，不必先拆除，所以可以放心使用。 P.27

選擇題

- 4.(1)氟化物可以加速牙齒表面再鈣化速度，要達到最好的效果，需要與氟化物
①長時間，高頻率接觸
②短時間，高頻率接觸
③長時間，低頻率接觸
④短時間，低頻率接觸 含氟漱口水單張
- 5.(1) 氟錠不宜與①牛奶 ②可樂 ③果汁 ④茶 一起吞食，以免影響氟之吸收 含氟漱口水單張
- 6.(3)以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用
①含氟牙膏②含氟漱口水③牛奶加氟④塗氟 含氟漱口水單張
- 7.(4) 氟錠的建議使用劑量，以下何者為對?
①6 個月~3 歲，每天 0.5mg.F
②6 個月~3 歲，每天 1mg.F
③6 歲以上，每天 0.5mg.F
④6 歲以上，每天 1mg.F 含氟漱口水單張
- 8.(2) 含氟牙膏的使用量
①沒有規範
②0-3 歲，牙膏量為薄薄一層
③成人牙膏量為薄薄一層
④0-3 歲，牙膏量為碗豆大 二要二不單張
- 9.(2) 各年齡的刷牙方式，何者有誤
①國中生(13-15 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
②國小 4 年級(9-10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
③幼稚園中班(4-5 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
④0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙。 二要二不單張

填充題 11 格

10 口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，當再鈣化作用>脫鈣作用時，不會蛀牙。



含氟漱口水單張

11. 含氟漱口水的建議含氟濃度 250PPM~1000 PPM

含氟漱口水單張

12. 含氟牙膏的建議含氟濃度 1000 PPM 以上

含氟漱口水單張

13. 專業局部塗氟，由牙醫師視情況每多久實施一次？ 3個月~6 個月一次

含氟漱口水單張

14. 世界衛生組織的建議，系統性氟化物運用方式有 氟錠，飲水加氟 等。

含氟漱口水單張

15 含氟漱口水建議長期使用下，至少 2 年，效果才會顯著。

含氟漱口水單張

14 在臼齒咬合面上，有很多微小的溝隙，牙醫師用一種特殊的牙科樹脂材料，將這些溝隙填平，以保護牙齒不易齲齒，這種保護牙齒的技術稱作_____ (窩溝封填，窩溝封閉 OR 溝隙封填)

二要二不單張

15. 乳牙有咀嚼功能，發音功能，還有誘導恆牙正確萌發的重大功能，如果乳牙過造齲齒脫落，易造成鄰牙_____及空間喪失(傾斜 OR 位移)

P.9

16 乳牙的過早脫落，為了維持應有的空間，避免造成空間喪失而會讓將來的恆齒長歪或無法萌出，所以要去找牙醫師幫忙裝置_____來保存此空間(空間維持器)

P.14