

2024 年全國潔牙觀摩賽試題

<選擇題>8 題

- 1.(2) 至牙醫診所進行口腔檢查時，阻生齒何時為檢查重點？
 - ①6-12 歲
 - ②12-18 歲
 - ③35-64 歲
 - ④以上皆是

- 2.(4) 至牙醫診所進行口腔檢查時，以下何者是每 3 個月檢查一次？
 - ①6-12 歲
 - ②65 歲以上
 - ③懷孕婦女
 - ④以上皆是

- 3.(3) 牙間刷的使用，何者有誤？
 - ①缺牙旁的牙齒，其鄰接面
 - ②矯正器四周
 - ③活動假牙的底部
 - ④牙根分叉處

- 4.(3) 以下哪個正確？
 - ①含氟漱口防齲計畫，開始於 1991 年，為期六年的先趨性成效評估計畫，發現可降低 26%齲齒率
 - ②2011 年，12 歲學童齲齒率高達 79.3%，於 30 個 OECD 國家，我國排行倒數第三
 - ③2012 年，12 歲恆齒齲齒指數為 2.5，與 34 個 OECD 國家，我國排行倒數第四
 - ④以上皆正確

- 5.(2) 以下哪個不是現階段在台灣可以取得局部氟化物使用：
 - ①含氟牙膏
 - ②氟鹽
 - ③含氟漱口水
 - ④塗氟

- 6.(3) 國中生氟錠的建議使用劑量，以下何者正確：
 - ①0.25mg，每日 1 顆
 - ②0.25mg，每日 2 顆
 - ③1mg，每日 1 顆
 - ④不建議使用

7.(3) 以下何者不是易致齲食物？

- ① 葡萄乾
- ② 汽水
- ③ 玉米
- ④ 蜂蜜水

8.(2) 各年齡的刷牙方式，何者有誤？

- ① 高中生(16-18 歲)貝氏刷牙法，自己刷，父母監督
- ② 國小 4 年級(10 歲)學習貝氏刷牙法，自己刷，父母加強重點
- ③ 幼稚園大班(5-6 歲)水平來回刷，自己刷一遍，父母也再刷一遍
- ④ 0-3 歲，水平來回刷，父母負責潔牙

<填充題>12 格

9. 口腔內的酸與氟化物的交互作用，造成 2 種作用，當 脫鈣作用 > 再鈣化 作用時，會齲齒。

10. 運用氟化物預防齲齒的方法大致分兩類，一是系統性使用方式，如：飲水加氟、氟錠、氟鹽等。

11. 在許多氟化物的使用方法中，最多人運用的方式是含氟牙膏，含氟濃度 1000 PPM 以上。

12. 專業塗氟可降低齲齒發生率 28 % ~ 46 %。

13. 含氟漱口水建議長期使用下，至少 2 年，效果才會顯著。

14. 0-3 歲含氟牙膏使用量為 少於薄薄一層或小於米粒大(約 0.1g)，
3 歲以上含氟牙膏使用量為 少於豌豆大(約 0.25g)。

15. 我們過去習慣稱作牙菌斑，後來改稱作 口腔生物膜。